Vol. VII, N.º 24 — pp. 267-270 12-XII-1946

PAPÉIS AVULSOS
DO
DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL

UM NOVO TOMÍSIDA BRASILEIRO (*ARANEAE - THOMISIDAE*) (*)

POR

HÉLIA ELLER MONTEIRO SOARES

INTRODUÇÃO

Num pequeno lote de aracnídeos obsequiosamente remetidos pelo Dr. PETR WYGODZINSKY encontrei uma espécie da família *Thomisidae*, gênero *Epicadinus* Simon, 1895, que considero nova, e como tal passo a descrever na presente nota.

THOMISIDAE

STEPHANOPSINAE

Epicadinus gavensis, sp. n.

(Figs. 1 e 2)

♂. Comprimento: 4,0 mm.

Cefalotórax tão longo quão largo, baixo, de bordos arredondados, abruptamente estreitado adiante. Olhos posteriores em linha levemente procurva, subiguais, os médios muito pouco mais afastados entre si que dos laterais. Olhos anteriores em linha muitíssimo recurva, iguais, os médios pouco mais afastados entre si que do laterais. Área dos olhos médios mais alta que larga, formando quase um retângulo, de olhos anteriores maiores que os posteriores. Clípeo vertical, mais baixo que a área dos olhos médios. Os olhos posteriores estão num plano horizontal, ao passo

(*) Entregue para publicação em 27-2-1946.



1

2

que os anteriores se acham num plano vertical. Todo o cefalotórax, incluindo o clípeo, provido de grossos grânulos espiníferos. Entre os olhos laterais anteriores e posteriores há dois grânulos espiníferos coalescentes, havendo ainda outro par mais ou menos no meio da área dos olhos médios. Esterno cordiforme. Lábio pouco mais largo que longo, de ápice arredondado, atingindo o meio das lâminas maxilares, que são levemente oblíquas. Pernas I e II muito mais longas que III e IV, com robustos tubérculos espiníferos, como vemos na figura.

Abdômen pentagonal, eriçado de fortes espinhos, com três ramos na metade posterior, um mediano e dois laterais. Fiandeiras e tubérculo anal circundados por uma auréola quitinosa.

Tíbia dos palpos e bulbo como na figura 2.

Cefalotórax e quelíceras amarelo-queimadas, o cefalotórax enegrecido de um lado e de outro, e com manchas enegrecidas irregulares; quelíceras também com estas últimas manchas. Esterno, lábio e lâminas maxilares amarelo-queimadas, o lábio e as lâminas manchadas de negro. Pernas I e II da mesma côr do cefalotórax, III e IV, porém, mais claras. Abdômen mais claro que o cefalotórax, com manchas negras irregulares e muito irregularmente distribuidas. Os três ramos do abdômen enegrecidos.

Tipos: 2 ♂ ♂, n.º 1, na coleção H. Soares.

Habitat: Gávea, Distrito Federal, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Coligidos pelo Dr. Petr Wygodzinsky, em 1944.

ABSTRACT

The authoress describes in this paper a new species of *Thomisidae*, genus *Epicadinus* Simon, 1895, from Brasil.